



SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
MEZINÁRODNÍ STANDARD

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD

2026

Tento Seznam nabývá účinnosti 1. ledna 2026.

Upozorňujeme, že níže uvedený seznam příkladů zdravotních stavů není úplný.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ TRVALE

S0 Neschválené látky.....	4
S1 Anabolické látky	5
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. hypogonadismu u mužů.	
S2 Peptidové hormony, růstové faktory, příbuzné látky a mimetika.....	7
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. anémie, hypogonadismu u mužů, nedostatku růstového hormonu.	
S3 Beta-2 agonisté.....	9
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. astmatu a jiných respiračních poruch.	
S4 Hormonové a metabolické modulátory	10
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. rakoviny prsu, cukrovky, neplodnosti (žen), syndromu polycystických vaječníků.	
S5 Diuretika a maskovací látky	12
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. srdečního selhání, hypertenze.	
M1 – M2 – M3 Zakázané metody.....	13

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

S6 Stimulanty.....	15
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. anafylaxe, poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), příznaků nachlazení a chřipky.	
S7 Narkotika	17
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. bolesti včetně bolesti způsobené poraněním pohybového aparátu.	
S8 Kanabinoidy	18
S9 Glukokortikoidy	19
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. alergie, anafylaxe, astmatu, zánětlivých onemocnění střev.	

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1 Beta-blokátory.....	20
Některé z těchto látek se nacházejí (bez omezení) v lécích používaných k léčbě např. srdečního selhání, hypertenze.	

INDEX	21
-------------	----

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU 2026 SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

PLATNOST OD 1. LEDNA 2026

Úvod

Seznam zakázaných látek a metod dopingu je povinný *Mezinárodní standard* v rámci Světového antidopingového programu.

Seznam je každoročně aktualizován po rozsáhlém konzultačním procesu zprostředkovaném *Světovou antidopingovou agenturou (WADA)*. *Seznam* je účinný od 1. ledna 2026.

Oficiální text *Seznamu zakázaných látek* bude uchovávat *WADA* a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickým a francouzským textem rozhoduje znění v angličtině.

Níže jsou uvedeny některé pojmy používané v tomto *Seznamu zakázaných látek a zakázaných metod*.

Zakázané při soutěži

Pokud *WADA* neschválila pro daný sport jiné období, představuje *Soutěžní období* v zásadě období začínající těsně před půlnocí (ve 23:59 hodin) v den předcházející *Soutěži*, které se má *Sportovec* zúčastnit, až do konce *Soutěže* a procesu odběru *Vzorku*.

Zakázané stále

To znamená, že látka nebo metoda je zakázána *Při soutěži* i *Mimo soutěž*, jak je definováno v *Kodexu*.

Specifické a Nespecifické

Podle článku 4.2.2 *Světového antidopingového kodexu* „pro účely aplikace článku 10 budou všechny *Zakázané látky Specifickými látkami*, s výjimkou těch označených v *Seznamu zakázaných látek a metod dopingu*. Žádná *Zakázaná metoda* nebude *Specifickou metodou*, pokud není v *Seznamu* konkrétně označena jako *Specifická metoda*“. Podle komentáře k článku „*Specifické látky a Specifické metody* uvedené v článku 4.2.2 by neměly být žádným způsobem považovány za méně důležité nebo méně nebezpečné než jiné dopingové látky nebo metody. Jde spíše o látky a metody, které *Sportovec* pravděpodobně užil nebo použil k jinému účelu než ke zlepšení sportovního výkonu.“

Návykové látky

Podle článku 4.2.3 *Kodexu* jsou *Návykové látky* definovány jako látky, které jsou jako takové označeny z důvodu jejich častého zneužívání ve společnosti mimo rámec sportu. Jako *Návykové látky* jsou označovány tyto látky: kokain, diamorfin (heroin), methyldioxymetamfetamin (MDMA/„extáze“), tetrahydrokanabinol (THC).

Vydal:

Světová antidopingová agentura
Place Victoria, 800, rue du
Square-Victoria, bureau 1700
Montréal (Québec)
H3C 0B4 Canada

URL: www.wada-ama.org Tel:
+1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Jakákoli farmakologická látka, na kterou se nevztahuje žádný z následujících oddílů *Seznamu* a která není v současné době schválena žádným vládním zdravotnickým regulačním orgánem pro léčebné použití u lidí (např. léčiva v předklinickém nebo klinickém vývoji nebo jejichž vývoj byl ukončen, značková léčiva, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.

Tato třída zahrnuje mnoho různých látek, mimo jiné BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP), stabilizátory komplexu ryanodinového receptoru-1-kalstabinu [např. S-107, S48168 (ARM210)] a aktivátory troponinu (např. reldesemtiv a tirasemtiv).

S1 ANABOLICKÉ LÁTKY

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Nespecifické látky*.

Anabolické látky jsou zakázány.

S1.1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS)

Při exogenním podání, mimo jiné včetně:

- 1-androstenediol (5 α -androst-1-en-3 β , 17 β -diol)
- 1-androstenedion (5 α -androst-1-en-3, 17-dion)
- 1-androsteron (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-en-17-on)
- 1-epiandrosteron (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-17-on)
- 1-testosteron (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-on)
- 4-androstenediol (androst-4-en-3 β , 17 β -diol)
- 4-hydroxytestosteron (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-on)
- 5-androstenedion (androst-5-en-3,17-dion)
- 7 α -hydroxy-DHEA
- 7 β -hydroxy-DHEA
- 7-keto-DHEA
- 11 β -methyl-19-nortestosteron
- 17 α -methylepithiostanol (epistan)
- 19-norandrostenediol (estr-4-en-3,17-diol)
- 19-norandrostenedion (estr-4-en-3,17-dion)
- Androst-4-en-3,11,17-trion (11-ketoandrostendion, adrenosteron)
- androstanolon (5 α -dihydrotestosteron, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-on)
- androstenediol (androst-5-en-3 β ,17 β -diol)
- androstendion (androst-4-en-3,17-dion)
- bolasteron
- boldenon
- boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion)
- calusteron
- clostebol
- danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)
- dehydrochlormethyltestosteron (4-chlor-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-on)
- desoxymethyltestosteron (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol a 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)
- dimethandrolon (7 α ,11 β -dimethyl-19-nortestosteron)
- drostanolon
- epiandrosteron (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-on)
- epi-dihydrotestosteron (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-on)
- epitestosteron
- ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)
- fluoxymesteron
- formebolon
- furazabol (17 α -methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)

S1.1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS) (pokračování)

- gestrinon
- mestanolon
- mesterolon
- metandienon (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-on)
- metenolon
- metandriol
- Methasteron (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-on)
- methyl-1-testosteron (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-on)
- metylklostebol
- methyldienolon (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-on)
- methylnortestosteron (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-on)
- metyltestosteron
- metribolon (methyltrienolon, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-on)
- miboleron
- nandrolon (19-nortestosteron)
- norboleton
- norklostebol (4-chlor-17 β -ol-estr-4-en-3-on)
- noretandrolon
- oxabolon
- oxandrolon
- oxymesteron
- oxymetolon
- prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-on)
- prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan)
- quinbolon
- stanazolol
- stenbolon
- testosteron
- tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-on)
- tibolon
- trenbolon (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on)
- trestolon (7 α -methyl-19-nortestosteron, MENT)

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky, včetně jejich esterů.

S1.2. OSTATNÍ ANABOLICKÉ LÁTKY

Mimo jiné včetně:

Clenbuterol, osilodrostat, ractopamin, selektivní modulátory androgenových receptorů [SARM, např. andarin, enobosarm (ostarin), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 a YK-11], zeranol a zilpaterol.

S2

PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Nespecifické látky*.

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky jsou zakázány.

S2.1. ERYTROPOETINY (EPO) A LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ ERYTROPOÉZU

Mimo jiné včetně:

S2.1.1 Agonisté erythropoetinových receptorů, např. darbepoetiny (dEPO); erythropoetiny (EPO); sloučeniny založené na EPO, [např. EPO-Fc, metoxypolyetylenglykol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetické prostředky a jejich sloučeniny (např. CNTO-530, peginesatid, pegmolesatid).

S2.1.2 Aktivační prostředky hypoxie vyvolávajícího faktoru (HIF), např. kobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

S2.1.3 Inhibitory GATA, např. K-11706.

S2.1.4 Inhibitory signalizace transformujícího růstového faktoru beta (TGF- β), např. luspatercept; sotatercept.

S2.1.5 Agonisté vrozeného opravného receptoru, např. asialo EPO; karbamylovaný EPO (CEPO).

PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA (pokračování)

S2.2. PEPTIDOVÉ HORMONY A JEJICH UVOLŇUJÍCÍ FAKTORY

S2.2.1 Peptidy stimulující testosteron u mužů, mimo jiné včetně:

- choriový gonadotropin (CG)
- luteinizační hormon (LH)
- hormon uvolňující gonadotropin (GnRH, gonadorelin) a jeho agonistické analogy (např. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin a triptorelin)
- kisspeptin a jeho agonistické analogy

S2.2.2 Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory, např. kortikorelin a tetrakosaktid.

S2.2.3 Růstový hormon (GH), jeho analogy a fragmenty, mimo jiné včetně:

- analogy růstového hormonu, např. lonapegsomatropin, somapacitan a somatrogen
- fragmenty růstového hormonu, např. AOD-9604 a hGH 176–191

S2.2.4 Faktory uvolňující růstový hormon, mimo jiné včetně:

- hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) a jeho analogy, např. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin a tesamorelin
- sekretagogy růstového hormonu (GHS) a jejich mimetika, např. anamorelin, kapromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin a tabimorelin]
- peptidy uvolňující GH (GHRP) [např. alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 a GHRP-6].

S2.3. RŮSTOVÉ FAKTORY A MODULÁTORY RŮSTOVÝCH FAKTORŮ

Mimo jiné včetně:

- fibroblastové růstové faktory (FGF)
- hepatocytový růstový faktor (HGF)
- růstový faktor 1 podobný inzulinu (IGF-1, mecasermin) a jeho analogy
- mechanické růstové faktory (MGF)
- růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF)
- thymosin- β 4 a jeho deriváty, např. TB-500
- vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF)

a další růstové faktory nebo modulátory růstových faktorů ovlivňující syntézu/degradaci proteinů ve svalech, šlachách nebo vazech, vaskularizaci, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken.

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Všichni selektivní i neselektivní beta-2 agonisté včetně všech optických izomerů jsou zakázány.

Mimo jiné včetně:

- | | | | |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|
| • arformoterol | • indakaterol | • reproterol | • tretochinol |
| • fenoterol | • levosalbutamol | • salbutamol | (trimetochinol) |
| • formoterol | • olodaterol | • salmeterol | • tulobuterol |
| • higenamin | • prokaterol | • terbutalin | • vilanterol |

 VÝJIMKY

- Inhalační salbutamol: maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, nepřekračujících 600 mikrogramů během 8 hodin po jakékoliv dávce
- Inhalační formoterol: maximální podaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, nepřekračujících 36 mikrogramů během 12 hodin po jakékoliv dávce
- Inhalační salmeterol: maximálně 200 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, nepřekračujících 100 mikrogramů během 8 hodin po jakékoliv dávce
- Inhalační vilanterol: maximálně 25 mikrogramů za 24 hodin

 POZNÁMKA

Přítomnost salbutamolu v moči v množství vyšším než 1000 ng/ml nebo formoterolu v množství vyšším než 40 ng/ml neodpovídá terapeutickému použití látky a bude považována za *Pozitivní laboratorní nález (AAF)*, pokud *Sportovec* neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl důsledkem terapeutické dávky (inhalační) až do výše uvedené maximální dávky.

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Zakázané látky ve třídách S4.1 a S4.2 jsou *Specifické látky*. Látky zařazené do tříd S4.3 a S4.4 jsou *Nespecifické látky*.

Následující hormonové a metabolické modulátory jsou zakázané.

S4.1. INHIBITORY AROMATÁZ

Mimo jiné včetně:

- 2-androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol)
- 2-androstenon (5 α -androst-2-en-17-on)
- 2-fenylbenzo[h]chromen-4-on
(α -naftoflavon; 7,8-benzoflavon)
- 3-androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol)
- 3-androstenon (5 α -androst-3-en-17-on)
- 4-androsten-3,6,17 trion (6-oxo)
- aminoglutetimid
- anastrozol
- androsta-1,4,6-trien-3,17-dion
(androstatriendion)
- androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)
- exemestan
- formestan
- letrozol
- testolacton

S4.2. ANTIESTROGENNÍ LÁTKY [ANTIESTROGENY A SELEKTIVNÍ MODULÁTORY
ESTROGENOVÝCH RECEPTORŮ (SERMS)]

Mimo jiné včetně:

- bazedoxifen
- elacestrant
- raloxifen
- klomifen
- fulvestrant
- tamoxifen
- cyklofenil
- ospemifen
- toremifen

HORMONÁLNÍ A METABOLICKÉ MODULÁTORY (pokračování)

S4.3. LÁTKY ZABRAŇUJÍCÍ AKTIVACI RECEPTORU AKTIVINU IIB

Mimo jiné včetně:

- protilátky neutralizující aktivin A
- konkurenty receptoru aktivinu IIB, např.:
 - falešné receptory aktivinu (např. ACE-031)
- protilátky proti receptoru aktivinu IIB (např. bimagrumab)
- inhibitory myostatinu, např.:
 - látky snižující nebo rušící expresi myostatinu
 - proteiny vážící myostatin (např. follistatin, propeptid myostatinu)
 - protilátky neutralizující myostatin nebo prekurzory (např. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

S4.4. METABOLICKÉ MODULÁTORY

S4.4.1

- Aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), např. 5-*N*,6-*N*-bis(2-fluorofenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-*b*]pyrazin-5,6-diamin (BAM15), AICAR, mitochondriální otevřený čtecí rámec 12S rRNA-c (MOTS-c)
- Agonisté peroxizomovými proliferáty aktivovaného receptoru delta (PPAR δ), např. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluormethyl)fenyl)thiazol-5-yl)methylthio)fenoxy) kyselina octová (GW1516, GW501516)
- agonisté Rev-erba, např. SR9009, SR9011

S4.4.2 insuliny a mimetika insulinů, např. S519, S597

S4.4.3 meldonium

S4.4.4 trimetazidin

MASKOVACÍ LÁTKY

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Všechna diuretika a maskovací látky, včetně všech optických izomerů, např. *d-* a *l-*, jsou zakázány.

Mimo jiné včetně:

- Diuretika, jako např.:
Acetazolamid; amilorid; bumetanid; kanrenon; chlortalidon; kyselina etakrynová; furosemid; indapamid; metolazon; spironolakton; thiazidy, např. bendroflumethiazid, chlorothiazid a hydrochlorothiazid; torasemid; triamteren; xipamid
- Vaptany, např. konivaptan, mozavaptan, tolvaptan
- plazmatické expandéry podávané intravenózně, např.: Albumin, dextran, hydroxyetyl škrob, mannitol
- Desmopresin
- Probenecid

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.



VÝJIMKY

- Drospirenon, pamabrom a lokální oftalmologické podávání inhibitorů karboanhydrázy (např. dorzolamidu, brinzolamidu)
- Lokální podání felypresinu v zubní anestezii

Nález jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem: u formoterolu, salbutamolu, katinu, efedrinu, metylefedrinu a pseudoefedrinu ve *Vzorku Sportovce* kdykoliv nebo případně *Při Soutěži* ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou (kromě lokálního očního podání inhibitoru karboanhydrázy nebo lokálního podání felypresinu v dentální anestezii), bude považován za *Pozitivní laboratorní nález (AAF)*, pokud Sportovec nemá schválenou *Terapeutickou výjimku (TV)* na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

ZAKÁZANÉ METODY

ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Všechny zakázané metody v této třídě jsou *Nespecifické* s výjimkou metod v M2.2, což jsou *Specifické metody*.

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

M1.1. *Podání* nebo opětovné zavedení jakéhokoliv množství autologní, allogenní (homologní) nebo heterologní krve nebo produktů z červených krvinek jakéhokoliv původu do oběhového systému.

Odběr krve nebo krevních složek (včetně aferézy), pokud není prováděn 1) pro analytické účely, včetně lékařských testů nebo *Dopingové kontroly*, nebo 2) pro účely dárce v odběrovém centru akreditovaném příslušným regulačním orgánem země, ve které působí.

M1.2. Umělé zvyšování příjmu, přenosu nebo dodávky kyslíku.

Mimo jiné včetně:

Perfluorochemikálie; efaproxiral (RSR13); voxelotor a modifikované hemoglobinové produkty, např. krevní náhražky na bázi hemoglobinu a mikrokapsulované hemoglobinové produkty, s výjimkou doplňkového kyslíku inhalací.

M1.3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M1.4. Používání dýchacích systémů nebo zařízení s recirkulací oxidu uhelnatého, pokud se neprovádí jako diagnostický postup pod dohledem lékaře nebo vědeckého pracovníka.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

M2.1. *Podvádění* nebo *Pokus o podvod* za účelem porušení integrity a platnosti *Vzorků* odebraných při *Dopingové kontrole*.

Mimo jiné včetně:

Záměna a/nebo úprava *Vzorku*, např. přidáním proteáz ke *Vzorku*.

M2.2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než celkem 100 ml za 12 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničního ošetření, chirurgických zákroků nebo klinických diagnostických vyšetření.

ZAKÁZANÉ METODY

(pokračování)

M3. GENOVÝ A BUNĚČNÝ DOPING

Z důvodu potencionálního zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

- M3.1. Použití nukleových kyselin nebo jejich analogů, které mohou změnit sekvence genomu a/nebo exprese genu jakýmkoliv mechanismem. To mimo jiné zahrnuje technologie úprav genů, umlčování genů a technologie přenosů genů.
- M3.2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk nebo buněčných komponent (např. jader a organel, jako jsou mitochondrie a ribozomy).

ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky* s výjimkou látek uvedených v S6.A, což jsou *Nespecifické látky*.

Návykové látky v této sekci: kokain a metylendioxyamfetamin (MDMA/„extáze“)

Všechna stimulantia, včetně všech optických izomerů, např. *d-* a *l-*, jsou zakázána. Stimulanty zahrnují:

S6.A: NESPECIFICKÁ STIMULANCIA

- adrafinil
- amfepramon
- amfetamin
- amfetaminil
- amifenazol
- benfluorex
- benzyloxypropylamin
- bromantan
- klobenzorex
- kokain
- kropropamid
- krotetamid
- fenkamin
- fenetylin
- fenfluramin
- fenproporex
- Fladrafinil (2-[bis(4-fluorofenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamid)
- Flmodafinil (2-[bis(4-fluorofenyl)methylsulfinyl]acetamid)
- fonturacetam [4-fenylpiracetam (karpfedon)]
- furfenorex
- hydrafinil (fluorenol)
- lisdexamfetamin
- mefenorex
- mefentermin
- mezokarb
- amfetamin(*d-*)
- *p*-metylamfetamin
- modafinil
- norfenfluramin
- fendimetrazin
- fentermin
- prenylamin
- prolantan

Stimulans, které není výslovně uvedeno v tomto oddíle, je *Specifickou látkou*.

S6.B: SPECIFICKÁ STIMULANCIA

Mimo jiné včetně:

- 2-fenylpropan-1-amin (β -methylfenylethyl-amin, BMPEA)
- 3-methylhexan-2-amin (1,2-dimethylpentylamin)
- 4-fluoromethylfenidat
- 4-methylhexan-2-amin (1,3-dimethylamylamin, 1,3 DMAA, methylhexanamin)
- 4-methylpentan-2-amin (1,3-dimethylbutylamin)
- 5-methylhexan-2-amin (1,4-dimethylamylamin, 1,4-dimethylpentylamin, 1,4-DMAA)
- benzfetamin
- katin**
- katinon a jeho analogy, např. mefedron, metedron a α -pyrrolidinovalerofenon
- dimetamfetamin (dimethylamfetamin)
- efedrin***
- epinefrin**** (adrenalin)
- etamivan
- etylfenidát
- etylamfetamin
- etilefrin
- famprofazon
- fenbutrazát
- fenkamfamin
- heptaminol
- hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin)
- isomethepten
- levmetamfetamin
- meklofenoxát
- methylendioxyamfetamin
- methylefedrin***
- methylnaftidát [(±)-methyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetát]
- methylfenidát
- midodrin
- niketamid
- norfenefrin
- oktodrin (1,5-dimethylhexylamin)
- oktopamin
- oxilofrin (metylsynefrin)
- pemolin
- pentetrazol
- fenetylamin a jeho deriváty
- fenmetrazin
- fenprometamin
- propylhexedrin
- pseudoefedrin*****
- selegilin
- sibutramin
- solriamfetol
- strychnin
- tenamfetamin (methylenedioxyamfetamin)
- tesofensin
- tuaminoheptan

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

VÝJIMKY

- Klonidin, guanfacin
- Deriváty imidazolinu pro dermatologické, nosní, oční nebo otické použití (např. brimonidin, klonazolin, fenoxazolin, indanazolin, nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin, xylometazolin) a stimulantia zařazená do Monitorovacího programu 2026*

* bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol a synefrin: Tyto látky jsou zařazeny do Monitorovacího programu 2026 a nejsou považovány za *Zakázané látky*.

** katin (d-norpseudoefedrin) a jeho l-izomer: je zakázán pouze při koncentraci v moči vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml.

*** efedrin a methylefedrin: zakázány při koncentraci v moči vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml.

**** epinefrin (adrenalin): není zakázáno lokální podávání, např. nosní, oční, nebo současné podávání s lokálními anestetiky.

***** pseudoefedrin: zakázán pouze při koncentraci v moči vyšší než 150 mikrogramů v 1 ml.

ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Návykové látky v této sekci: diamorfin (heroin)

Následující narkotika, včetně všech optických izomerů, např. *d-* a *l-*, jsou zakázána.

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| • buprenorfin | • fentanyl a jeho deriváty | • morfin | • pentazocin |
| • dextromoramid | | • nikomorfin | • petidin |
| • diamorfin (heroin) | • hydromorfon | • oxykodon | • tramadol |
| | • metadon | • oxymorfon | |

ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Návykové látky v této sekci: tetrahydrokanabinol (THC)

Všechny přírodní a syntetické kanabinoidy jsou zakázané, např.

- v konopí (hašiš, marihuana) a konopných produktech
- přírodní a syntetické tetrahydrokanabionoly (THC)
- syntetické kanabinoidy napodobující účinky THC

VÝJIMKY

- kanabidiol

ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Všechny glukokortikoidy jsou zakázány, pokud jsou podávány jakoukoliv injekční, perorální [včetně oromukózní (např. bukální, gingivální, sublingvální)] nebo rektální cestou.

Mimo jiné včetně:

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| • beklometazon | • dexamethason | • mometazon |
| • betametazon | • flunisolid | • prednizolon |
| • budesonid | • fluokortolon | • prednizon |
| • ciklesonid | • flutikason | • triamcinolon acetonid |
| • kortizon | • hydrokortizon | |
| • deflazakort | • methylprednisolon | |

 POZNÁMKA

- Jiné způsoby podání (včetně inhalačního a topického: dentálně-intrakanálního, dermálního, intranazálního, oftalmologického, ušního a perianálního) nejsou zakázány, pokud se používají v rámci výrobcem doporučených dávek a terapeutických indikací.

ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

Všechny zakázané látky v této třídě jsou *Specifické látky*.

Beta-blokátory jsou zakázány pouze v následujících sportech *Při Soutěži* a kde je to označeno symbolem (*) i *Mimo soutěž*.

- lukostřelba (WA)*
- automobilový sport (FIA)
- biliard (všechny disciplíny) (WCBS)
- šipky (WDF)
- golf (IGF)
- mini-golf (WMF)
- střelba (ISSF, IPC)*
- Podvodní sporty (CMAS)* v disciplínách volného potápění, lovu harpunou a střelby na terč

* zakázané také *Mimo soutěž*

Mimo jiné včetně:

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| • acebutolol | • bunolol | • labetalol | • oxprenolol |
| • alprenolol | • karteolol | • metipranolol | • pindolol |
| • atenolol | • karvedilol | • metoprolol | • propranolol |
| • betaxolol | • celiprolol | • nadolol | • sotalol |
| • bisoprolol | • esmolol | • nebivolol | • timolol |

(±)-methyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetát, 16
(na bázi krevních náhražek), 13
[1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol), 5
1,2-dimethylpentylamin, 16
1,3-dimethylamylamin (1,3 DMAA), 16
1,3-dimethylbutylamin, 16
1,4-dimethylamylamin (1,4-DMAA), 16
1,4-dimethylpentylamin, 16
1,5-dimethylhexylamin, 16
11-ketoandrostenedion, 5
11 β -methyl-19-nortestosteron, 5
17 α -metyl
[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-
17 α -metyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol, 5
17 α -metyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol, 5
17 α -metylepitiostanol, 5
17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-on, 6
17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan, 6
17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-on, 6
17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-on, 6
17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-on, 6
17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-on, 6
17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-on, 6
17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-on, 5
17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-on, 5
17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-on, 5
17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on, 6
19-norandrostenediol, 5
19-norandrostenedion, 5
19-norpregna-4-en-17 α -ol, 5
19-nortestosteron, 6
1-androstenediol, 5
1-androstenedion, 5

1-androsteron, 5
2,4-dinitrofenol (DNP), 4
2-[bis(4-fluorofenyl)methylsulfinyl]acetamid, 15
2-[Bis(4-fluorofenyl)methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamid, 15
2-androstenon, 10
2-fenylbenzo[h]chromen-4-on, 10
2-fenylpropan-1-amin, 16
3 α -hydroxy-5 α -androst-1-en-17-on, 5
3-androstenol, 10
3-androstenon, 10
3-methylhexan-2-amin, 16
3 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-17-on, 5
3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-on, 5
3 β -hydroxyandrost-5-en-17-on, 6
4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-on, 5
4-androsten-3,6,17 trion, 10
4-androstenediol, 5
4-fenylpiracetam, 15
4-fluoromethylfenidát, 16
4-hydroxytestosteron, 5
4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -metylandrosta-1,4-dien-3-on, 5
4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-on, 6
4-methylhexan-2-amin, 16
4-methylpentan-2-amin, 16
5 α -androst-1-en-3, 17-dion, 5
5 α -androst-1-en-3 β , 17 β -diol, 5
5 α -androst-2-en-17-ol, 10
5 α -androst-2-en-17-on, 10
5 α -androst-3-en-17-ol, 10
5 α -androst-3-en-17-on, 10
5 α -androstan-17 β -ol, 5
5 α -dihydrotestosteron, 5
5-androstenedion, 5
5-methylhexan-2-amin, 16
7,8-benzoflavon, 10
7 α , 11 β -dimethyl-19-nortestosteron, 5
7 α -hydroxy-DHEA, 5
7 α -metyl-19-nortestosteron, 6
7 β -hydroxy-DHEA, 5

A

ACE-031, 11
Acebutolol, 20
Acetazolamid, 12
Adrenalin, 16
Adrenosteron, 5
Aferéza, 13
Agonisté Rev-erba , 11
Agonisté vrozeného opravného receptoru, 7 Růstový faktor podobný inzulinu-1 (IGF-1), 8 Mimetika insulinů, 11
AICAR, 11
Aktivátory proteinkinázy aktivované AMP (AMPK), 11
Aktivátory troponinu, 4
Albumin, 12
Alexamorelin, 8
Alprenolol, 20
Amfepramon, 15
Amfetamin, 15
Amfetaminil, 15
Amifenazol, 15
Amilorid, 12
Aminoglutetimid, 10
AMP-aktivovaná protein kináza (AMPK), 11 anamorelin, 8
 α -naftoflavon, 10
Anastrozol, 10
Andarin, 6
Androst-4-en-3,11,17-trion, 5
Androst-4-en-3,17-dion, 5
Androst-4-en-3 β ,17 β -diol, 5
Androst-5-en-3,17-dion, 5
Androst-5-en-3 β ,17 β -diol, 5
Androsta-1,4,6-trien-3,17-dion, 10
Androsta-1,4-dien-3,17-dion, 5
Androsta-3,5-dien-7,17-dion, 10
Androstanolon, 5
Androstatrienedion, 10
Androstenediol, 5
Androstenedion, 5
Androst-enol, 10
Apitegromab, 11

REJSTŘÍK

α -pyrrolidinovalerofenon, 16

Arformoterol, 9

Arimistan, 10

ARM210, 4

Asialo EPO, 7

Atenolol, 20

B

BAM15, 11

Bazedoxifen, 10

Beklometazon, 19

Bendroflumethiazid, 12

Benfluorex, 15

Benzfetamin, 16

Benzylpiperazin, 15

Betametazon, 19

Betaxolol, 20

Bimagrumab, 11

Bisoprolol, 20

BMPEA, 16

Bolasteron, 5

Boldenon, 5

Boldion, 5

BPC-157, 4

Brimonidin, 16

Brinzolamid, 12

Bromantan, 15

Budesonid, 19

Bumetanid, 12

Buněčné složky (jádra), 14

Buněčné složky (mitochondrie), 14

Buněčné složky (ribozomy), 14

Chlorothiazid, 12

Buňka (červené krvinky), 13

Buňka (doping), 14

Buňka (geneticky modifikovaná), 14

Buňka (normální), 14

Bunolol, 20

Buprenorfin, 17

Bupropion, 16

Buserelin, 8

C

Calusteron, 5

Celiprolol, 20

CJC-1293, 8

CJC-1295, 8

CNTO-530, 7

Cyklofenil, 10

Činidla aktivující hypoxii indukovaný faktor (HIF), 7

D

Danazol, 5

Daprodustat, 7

Darbepoetiny (dEPO), 7

Deflazakort, 19

Dehydroepiandrosteron (DHEA), 6

Dehydrochlorometylt testosteron, 5

Deslorelin, 8

Desmopresin, 12

Desoxymethyltestosteron, 5

Dexametazon, 19

Dextran, 12

Dextromoramid, 17

Diamorfin, 17

Dimetamfetamin, 16

Dimethandrolon, 5

Dimethylamfetamin, 16

Domagrozumab, 11

Dorzolamid, 12

Drospirenon, 12

Drostanolon, 5

Dýchací systémy nebo zařízení s recirkulací oxidu uhelnatého, 13

E

Efaproxiral (RSR13), 13

Efedrin, 12, 16

Elacestrant, 10

Enobosarm, 6

Epiandrosteron, 5

Epiandrosteron, 5

Epi-dihydrotestosteron, 5

Epinefrin, 16

Epistan, 5

Epitestosteron, 5

EPO mimetické látky, 7 Agonisté

receptoru erythropoetinu, 7

Erythropoetiny (EPO), 7

EPO-Fc, 7

Esmolol, 20

Estery anabolických androgenních steroidů, 6

Estr-4-en-3,17-diol, 5

Estr-4-en-3,17-dion, 5

Etamivan, 16

Etilamfetamin, 16

Etilefrin, 16

Etilestrenol, 5

Etylfenidát, 16

Examorelin, 8

Exemestan, 10

Extáze, 15

F

Famprofazon, 16

Felypresin, 12

Fenbutrazát, 16

Fendimetrazin, 15

Fenetylamin, 16

Fenetylin, 15

Fenfluramin, 15

Fenkamfamin, 16

Fenkamin, 15

Fenmetrazin, 16

Fenoterol, 9

Fenoxazolin, 16

Fenprometamin, 16

Fenproporex, 15

Fentanyl, 17

Fentermin, 15

Fenylefrin, 16

Fenylpropanolamin, 16

Fibroblastové růstové faktory (FGF), 8

Fladrafinil 15

Flmodafinil 15

Flunisolid, 19

Fluokortolon, 19

Fluorenol, 15

Fluoxymesteron, 5

Flutikason, 19

Folistatin, 11

REJSTŘÍK

Fonturacetam, 15
Formebolon, 5
Formestan, 10
Formoterol, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furazabol, 5
Furfenorex, 15
Furosemid, 12

G

Genový doping, 14
Gestrinon, 6
Goserelin, 8
Grelín, 8
Guanfacin, 16
GW1516, 11
GW501516, 11

H

Hašiš, 18
Hemoglobin
Hemoglobin (mikroenkapsulované produkty), 13
Hemoglobin (produkty), 13
Hepatocytový růstový faktor (HGF), 8
Heptaminol, 16
Heroin, 17
Hexarelin, 8
hGH 176–191, 8
Higenamin, 9
Histrelin, 8
Hormon uvolňující gonadotropin (GnRH), 8
Hydrafinil, 15
Hydrochlorothiazid, 12
Hydrokortizon, 19
Hydromorfon, 17
Hydroxyamfetamin, 16
Hydroxyetylový škrob, 12
Chinbolon, 6
Chlortalidon, 12
Choriový gonadotropin (CG), 8
Ciklesonid, 19

I

Ibutamoren, 8
Imidazolin, 16
Indakaterol, 9
Indanazolin, 16
Indapamid, 12
Infuze, 13
Inhibitory GATA, 7
Inhibitory myostatinu, 11
Inhibitory signalizace transformujícího růstového faktoru beta (TGF- β), 7
Injekce (>100 ml), 13
Intravenózní infuze/injekce, 13
Inzulíny, 11
IOX2, 7
Ipamorelin, 8
Isomethepten, 16
Jádra/nukleus, 14

K

K-11706, 7
Kanabidiol, 18
Kanrenon, 12
Kapromorelin, 8 Karbamylovaný EPO (CEPO), 7 Oxid uhelnatý, 13
Karfedon, 15
Karteolol, 20
Karvedilol, 20
Kathin, 12, 16
Kathinon, 16
Keto-DHEA, 5
Kispeptin, 8
Klenbuterol, 6
Klobenzorex, 15
Klomifen, 10
Klonazolin, 16
Klonidin, 16
Klostebol, 5
Kobalt, 7
Kofein, 16
Kokain, 15
Konivaptan, 12
Konopí, 18

Konstrukty na bázi EPO, 7
Kortikorelin, 8
Kortikotrofiny, 8
Kortizon, 19
Krev (autologní), 13
Krev (heterologní), 13
Krev (homologní), 13
Krev (složky), 13
Krev, 13
Kropropamid, 15
Krotetamid, 15
Kyselina etakrynová, 12

L

Labetalol, 20
Landogrozumab, 11
Lenomorelin, 8
Letrozol, 10
Leuprorelin, 8
Levmetamfetamin, 16
Levosalbutamol, 9
LGD-4033, 6
Ligandrol, 6
Lisdexamfetamin, 15
Lonapegsomatropin, 8
Luspatercept, 7
Luteinizační hormon (LH), 8

M

Macimorelin, 8
Manipulace s krví, 13
Manitol, 12
Marihuana, 18
Mecasermin, 8
Mefedron, 16
Mefenorex, 15
Mefentermin, 15
Mechanické růstové faktory (MGF), 8
Meklofenoxát, 16
Meldonium, 11
MENT, 6
Mestanolon, 6
Mesterolon, 6
Metadon, 17

REJSTŘÍK

Metamfetamin(d-), 15
Metandienon, 6
Metandriol, 6
Metasteron, 6
Metedron, 16
Metenolon, 6
Methylefedrin, 12, 16
Methylendioxyamfetamin, 16
Methylendioxyamfetamin, 16
Methylfenidát, 16
Methylhexanamin, 16
Methylnaftidát, 16
Methylprednisolon, 19
Methylsynefrin, 16
Metipranolol, 20
Metolazon, 12
Metoprolol, 20
Metoxypolyetylen glykol epoetin beta (CERA), 7
Metribolon, 6
Metyl-1-testosteron, 6
Metyldienolon, 6
Metylklostebol, 6
Metylnortestosteron, 6
Metyltestosteron, 6
Methyltrienolon, 6
Mezokarb, 15
Miboleron, 6
Midodrin, 16
Mitochondriální otevřený čtecí rámec
12S rRNA-c, 11
Mitochondrie, 14
MK-677, 8
Modafinil, 15
Molidustat, 7
Mometason, 19
Morfin, 17
MOTS-c, 11
Mozavaptan, 12

N

N,6-N-bis(2-fluorofenyl)-[1,2,5]
oxadiazolo[3,4-b]pyrazin-5,6-diamin,
11
Nadolol, 20

Nafarelin, 8
Nafazolin, 16
Nandrolon, 6
Nebivolol, 20
Niketamid, 16
Nikomorfin, 17
Nikotin, 16
Norboleton, 6
Noretandrolon, 6
Norfenefrin, 16
Norfenfluramin, 15
Norklostebol, 6
Nukleové kyseliny, 14

O

Odběr krve, 13
Oktodrin, 16
Oktopamin, 16
Olodaterol, 9
on, 6
Orgány (např. jádra, mitochondrie,
ribozomy), 14
Osilodrostat, 6
Ospemifen, 10
Ostarin, 6
Oxabolon, 6
Oxandrolon, 6
Oxilofrin, 16
Oxo, 10
Oxprenolol, 20
Oxykodon, 17
Oxymesteron, 6
Oxymetazolin, 16
Oxymetolon, 6
Oxymorfon, 17

P

Pamabrom, 12
Parahydroxyamfetamin, 16
Peginesatid, 7
Pegmolesatid, 7
Pemolin, 16
Pentazocin, 17
Pentetrazol, 16
Peptidy stimulující testosteron, 8

Peptidy uvolňující GH (GHRP), 8
Gonadorelin, 8
Perfluorochemikálie, 13 Agonisté
receptoru aktivovaného
peroxizómovými
Pindolol, 20
Pipradrol, 16
Plazmatické expandéry, 12
Podvádění, 13
Palmorelin, 8
Prasteron, 6
Prednisolon, 19
Prednison, 19
Prenylamin, 15
Probenecid, 12
Prokaterol, 9
proliferátory delta, 11 petidin, 17
Prolintan, 15
Propeptid myostatínu, 11
Propranolol, 20
Propylhexedrin, 16
Prostanozol, 6
Proteázy, 13
Proteiny vážící myostatin, 11
Protilátky neutralizující aktivin A, 11
Konkurenti receptoru aktivinu IIB, 11
adrafinil, 15
Protilátky neutralizující myostatin, 11
Protilátky neutralizující prekurzor
myostatínu, 11
Protilátky proti receptoru aktivinu IIB,
11 AOD-9604, 8
Přenos genů, 14
Pseudoefedrin, 12, 16

Q

Quinbolon, 6

R

RAD140, 6
Raktopamin, 6
Raloxifen, 10
Reldesemtiv, 4
Reproterol, 9

REJSTŘÍK

Ribozomy, 14
Roxadustat, 7
Růstový faktor odvozený z krevních
destiček (PDGF), 8 p-
methylamfetamin, 15
Růstový hormon (GH), 8

S

S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4
S519, 11
S597, 11
Salbutamol, 9, 12
Salmeterol, 9
Sekretagoga růstového hormonu
(GHS), 8
Selegilin, 16
Selektivní modulátory androgenových
receptorů (SARM), 6
Sermorelin, 8
Sibutramin, 16
Solriamfetol, 16
Somapacitan, 8
Somatrogon, 8
Sotalol, 20
Sotatercept, 7
Spironolakton, 12
SR9009, 11
SR9011, 11
β-methylfenylethylamin, 16
Stabilizátory komplexu
ryanodinového receptoru-1-
kalstabinu, 4

Stamulumab, 11
Stanozolol, 6
Stenbolon, 6
Strychnin, 16
Synefrin, 16

T

Tabimorelin, 8
Tamoxifen, 10
TB-500, 8
Tenamfetamin, 16
Terbutalin, 9
Tesamorelin, 8
Tesofensin, 16
Testolakton, 10
Testosteron, 5
Testosteron, 6
Tetrahydrogestrinon, 6
Tetrahydrokanabinoly, 18
Tetrakosaktid, 8
Tetryzolin, 16
Thymosin-β4, 8
Tiazidy, 12
Tibolon, 6
Timolol, 20
Tirasemtiv, 4
Tolvaptan, 12
Torasemid, 12
Toremifen, 10
Tramadol, 17
Tramazolin, 16
Trenbolon, 6
Trestolon, 6
Tretochinol, 9
Triamcinolon acetonid, 19
Triamteren, 12

Trimetazidin, 11
Trimetochinol, 9
Triptorelin, 8
Tuaminoheptan, 16
Tulobuterol, 9

U

Umlčování genů, 14
Úprava genů, 14

V

Vadadustat (AKB-6548), 7
Vaptany, 12
Vaskulární endoteliální růstový faktor
(VEGF), 8
Vilanterol, 9
Voxelotor, 13

X

Xenon, 7
Xipamid, 12
Xylometazolin, 16

Y

YK-11, 6

Z

Zeranol, 6
Zilpaterol, 6



www.wada-ama.org



www.wada-ama.org